



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas...

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

vol. 1: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13829>

Page(s): Title Page, Page 219, Page 220

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 5 October 2024 2:45 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1740679i00013829.pdf>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:TIS SVECIE ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS I.

Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Polonicae ac Electoris Saxon.

HOLMIÆ,

IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

Atriplex sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 119.

Pes anserinus. *Dalech. hist.* 542. t. 542.

Habitat in Europæ cultis, ruderatis. ☉

4. CHENOPODIUM foliis ovatis acutis dentatis, racem^{murale.}is ramosis nudis. *Fl. suec.* 211. *Dalib. paris.* 211.

Chenopodium erectum ramosissimum, foliis triangularibus dentatis, racemis ramosis caulem superantibus. *Hort. cliff.* 85. *Lech. scan.* 16.

Habitat in Europæ muris aggeribusque. ☉

5. CHENOPODIUM foliis rhomboideo-triangulari^{album.}bus erosis postice integris: summis oblongis, racemis erectis. *Fl. suec.* 212. *Dalib. paris.* 80.

Chenopodium foliis inferioribus ovatis acutis antrorsum dentatis: summis lanceolatis. *Vir. cliff.* 22. *Hort. cliff.* 85. *Gron. virg.* 145. *Roy. lugdb.* 219. *Hall. belv.* 175.

Habitat in agris Europæ. ☉

6. CHENOPODIUM foliis rhomboideis dentato-sinuatis^{viride.}, racemis ramosis subnudis. *Fl. suec.* 213. *Dalib. paris.* 78.

Chenopodium sylvestre, opuli folio. *Vaill. paris.* 36. t. 7. f. 1.

Chenopodium folio oblongo integro. *Dill. app.* 62.

Habitat in Europæ cultis oleraceis.

7. CHENOPODIUM foliis cordatis angulato-acuminatis^{hybridum.}, racemis ramosis nudis. *Fl. suec.* 214. *Dalib. paris.* 79.

Chenopodium foliis triangulari-sagittatis: infra medium sinuato-dentatis, racemis longissimis. *Hort. cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 219.

Chenopodium stramonii folio. *Vaill. paris.* 36. t. 7. f. 2.

Atriplex sylvestris latifolia, acutiore folio. *Baub. pin.* 119.

Habitat in Europæ cultis. ☉

8. CHENOPODIUM foliis oblongis sinuatis, racemis *Botrys.* nudis multifidis. *Hort. cliff.* 84. *Hort. ups.* 55. *Mat. med.* 109. *Roy. lugdb.* 219. *Sauv. monsp.* 273.

Botrys ambrosioides vulgaris. *Baub. pin.* 138.

Botrys. *Dod. pempt.* 34.

Habitat in Europæ australis arenosis. ☉

9. CHENOPODIUM foliis lanceolatis dentatis, racem^{ambrosioides.}is

mis foliatis simplicibus. *Hort. cliff.* 84. *Hort. ups.* 56. *Roy. lugdb.* 219.

Botrys ambrosioides mexicana. *Baub. pin.* 138. 516.

Botrys odorata suavecolens americana mexicana. *Morris. hist.* 2. p. 605. f. 5. t. 35. f. 8.

Habitat in Mexico, Lusitania. ☉

multifidum. 10. CHENOPODIUM foliis multifidis: segmentis linearibus, floribus axillaribus sessilibus.

Chenopodium sempervirens, foliis tenuiter laciniatis.

Dill. elth. 78. t. 66. f. 77.

Habitat in Bonaria. ☽

anthelminticum. 11. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis dentatis, racemis aphyllis.

Chenopodium, lycopi folio, perenne. *Dill. elth.* 77. t. 66. f. 76.

Habitat in Pennsylvania, Bonaria. ☽

glaucum, 12. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis simplicibus glomeratis *Fl. suec.* 215. *Dalib. paris.* 77.

Chenopodium foliis ovato oblongis repandis sinuatis, florum racemis glomeratis ex ala solitariis. *Vir. cliff.* 22. *Hort. cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219.

Chenopodium angustifolium laciniatum minus. *Tournef. inst.* 506.

Habitat ad Europæ fimeta. ☉

* * foliis integris.

Vulvaria. 13. CHENOPODIUM foliis integerrimis rhombeo-ovatis, floribus conglomeratis. *Fl. suec.* 216. *Mat. med.* 108. *Dalib. paris.* 77.

Chenopodium foliis triangulari-ovatis. *Hort. cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 218.

Atriplex foetida. *Baub. pin.* 119.

Vulvaria. *Dalech. hist.* 543.

Habitat in Europæ cultis oleraceis, ☉

polyspermum 14. CHENOPODIUM foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis.

Chenopodium foliis ovatis integerrimis, caule decumbente. *Vir. cliff.* 21. *Fl. suec.* 217. *Roy. lugdb.* 218.

Dalib. paris. 77.

Blitum foliis ovatis. *Hort. cliff.* 28.

Blitum polyspermum. *Baub. pin.* 118.

Polyспорon cassiani, bassii, anguillare. *Lob. hist.* 128.

Habitat in Europæ cultis. ☉

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

CAROLI LINNZEI

S: R:crg. M:ris Sveciæ AncuiaTRI; Mzopic.: & BorAx,
Paorrss. UPsAr; EQUITIS AUR. DE STELLA Porani;
nec non AcaD. IMPER. MowsprEr. BERor. Toros.
U»rsar. STOCKH.: Soc. & PARIS. CORESP.

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES
PLANTAS RITE COGNITAS,

AD
GENERA RELATAS,
CUM
DirrFRENTIIS SPrcIFICIS,
NowiNIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

Locis NaraLIBUs,
SECUNDUM

„SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.
Towus I

Cum Privilégio S. R. Mtis Suecie 3? S. R. Mtis. Polonice ac Eletloris. Saxon,
«TON SN MT S NANASI — DIT ININ m ^

HOLMIÆ,
IureNSiS LAURENTII SALVII.

[Begin Page: Page 219]

PENTANDRIA DIGYNIA, 219

Atriplex fylvefrtris latifolia. Bauk. pi?. 119.
Pes anferinus, Dalech. hift. g42. t. \$42.
Habitat in Europë cultis, ruderatis. ©

4, CHENOPODIUM foliis ovatis acutis dentatis, race- marale,
. mis ramofis nudis. 77. fec. 211. Dalib, parif. 21.

Chenopodium ercétum ramofilium, foliis triangularibus dentatis, racemis ramosis caulem superantibus. Hort. cliff. 8s. Lech. fcau. 16.)

Habitat in Europe muris aggeribusque. C)

f\$. *CHENOPODIUM* foliis rhomboideo - triangulari- «hum. bus erofis poftice integris; fumrnis oblongis, racemis erectis. F7. fuec, 212. Dalib. parif. 8o.

Chenopodium foliis inferioribus ovatis acutis antrorfum dentatis: fummis lanceolatis. Vir. cliff. 22. Hort. ofr 8y. Gron, virg. 145. Roy. lugdb, 219. Hall.

ers. 175.

Habitat in agris Europz, ©

6: *CHENOPODIUM* foliis rhomboideis dentato-finua- ite, is, racemis ramosis. {fubnudis. F/. fuec, 213. Dalib, pat 78. ; .

Chenopodium fylveftre, opuli folio, Faill; parif. 36. t.

Ee (JJ. I

Chenopodium folio oblongo integro, Dill, app. 62.

Habitat in Europa cultis. oleracets, :

7: *CHENOPODIUM* foliis cordatis angulato-acumina- bybridum, Hi racemis ramosis nudis, F7, fuge, 214. Dalib, pa- E ry. 79 à ;

Chenopodium foliis triangulari-fagittatis: infra medium finuato-dentatis, racemis longiffimis. Hort, cliff. 84. Roy, Ingdb. 219, |

"*Cheripodium ftramonii folio. Vaill. parif. 36. 1.7. f. 2.*

Atriplex fylve(iris latifolia, acutiore folio. Banh. pin. I9,

Habitat i» Europe cultis. Q

y *CHENOPODIUM* foliis oblongis finuatis, racemis Botrys, Audis multifidis. Horz. cliff. 84. Hort. upf. \$5. Mat. med. 109. Róy. lugdb. 219. Sauv. mog]p. 273.

.S9trys ambrofioides vulgaris. Bauh. piz.138. -

TOUYS. Dod. pempt. 34. —

. Habitat in Europe enjitali arenfis. Q

i s *CHENOPODIUM* foliis lanceolatis- dentatis, race- ambrofioides. E £- mis ;

[Begin Page: Page 220]

220 PENTANDRIA |. DIGYNIA.

mis folatis fimplicibus. Horz. cliff. 84. Hort. upf |

\$6. Roy. lugdb. 219. .

DBotrys ainbrofioides mexicana, Banh. pin. 138. \$16.

Botrys odorata fuaveolens americana mexicanave. Mo- -

rif. hif. 2. p. Go. f. 3. t. 3\$. f. 8.

Habitat in Mexico, Lufitania. c

wulifdm, 10. CHENOPODIUM foliis muitifidis: fegmentis line-
aribus, floribus axillaribus feffilibus.

Chenopodium fem

Dill. eltb. 78. t. 66. f. 77.

Habitat iz Bonaria. b |

autbelninti- 11. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis dentatis,
euin, racemis aphyllis.

Chenopodium, lycopi folio, perenne. Dill. elth 77. t. 4

66. f. 76. |

Habitat in Penfylvania, Bonaria. z

£ 12, CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis repandis, -

racemis nudis fimplicibus glomeratis 747. fec. 215.

Dalib. TE 77- .

Chenopodium foliis ovato oblongis repande finuatis,
florum racemis glomeratis ex ala folitariis. Jir. chif.

22. Hort. cliff. M Ros. Ingdb. 219.

Chenopodium anguitifolium laciniatum minus. Zoar»ef.
inji. \$c6.

Habitat ad Europe fimeta. © -

* * foliis integris. :

Fawrit. 15. CHENOPODIUM. foliis integerrimis rhombeo-o-
vatis, floribus conglomeratis. F7. fuec. 216. Mat.

med. 108. Dalib. parif. 77. i

Chenopodium foliis triangulari -ovatis.. Horz. cliff. 84.

. Roy. lugdb. 218. \$

Atriplex foetida. Bazh. piz. 119.

Vulvaria. Dalecb. hift. y43- I

Habitat in Europæ cultis oleraceis, Q 2

polyfermnm 15. CHENOPODIUM foliis integerrimis ovatis, cau-
le decumbente, cymis dichotomis.

Chenopodium foliis ovatis integerrimis, caule decum-
bente, Vir. cliff. 11. Fl. fuec. 217. Roy. lugdb. 218.

Dalib. parif. 77. dt

Blitum foliis ovatis. Hort. cliff. 28.

Blitum polypermum. Baz. pin. 118.

Polyporon Cagliani, baffi, anguillate. Lo. hift. 138. 3

Habitat in Europe cultis. ©

pervirens, foliis tenuiter laciniatis.