



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Botanische Jahrbücher für Systematik,
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie**
Stuttgart [etc.], Schweizerbart [etc.],
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/60>

Bd.9 (1888): <https://www.biodiversitylibrary.org/item/668>

Page(s): Page 93, Page 94

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library
Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 22 March 2024 6:33 AM
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1684123i00000668.pdf>

This page intentionally left blank.

»Ex spec. *Vogelianis* quae sola mihi in herb. supersunt nimium deformibus loculi «
»semper 4-spermi.«

»Hab. In Ins. S. Vincent (Th. Vogel).«

»*K. fruticosa* Webb, syn. ined.«

»frutex ramis divaricatis foliis oppositis alternisque lanceo-«
»latis basi attenuatis petiolatis apice acutis glandula obtusa mucronatis«
»glabrescentibus, petalis calyce 2 plo longioribus, lamina orbiculata«
»erosa, staminibus brevioribus basi intus ampliatis, staminum breviorum«
»glandulis brevissimis, longiorum maximis filiformibus, stylo ovarii ovati«
»longitudine, siliculis subrotundo-ovatis 4 spermis.«

»Hab. Ins. S. Nicolai vall. Ribeira Brava (Bolle) fl. lactei. Haec est «
»species procera et a priore forsan distinguenda quam in herb. mus. Paris.«
»visam in annotatione spic. gorg. l. cit. praenuntiavi.«

Alyssum L.

A. campestre L.

»Hab. Inter pumices montis Nublo Canar. (Bourg.).«

Lepidium L.

L. procumbens L.

Hab. Orotavae l. Hillebrand.

Iberis L.

I. odorata L.

»Hab. Canaria : Tenteniguada (Despr.).«

Isatis L.

I. tinctoria L.

»var. *hirsuta* DC.«

»Hab. In rupibus S. Petri ins. Hierro (Bourg.).«

Carrichtera DC.

C. Vellae DC.

Hab. Teneriffae prope La Paz Orotavae l. Hillebr. unicum specim. pr.
S. Cruz Masferrer recuerd. 349 aequem unum specim. »Canaria (Despr.)
Fuerteventura penins. Handia et Ins. Lobos (Bolle).«

Crambe L.

Sect. *Dendrocrambe* Webb.

Cr. Pritzelii C. Bolle in Append. plant. nov. Hort. Berol. 1864,
cui synonyma

»*Cr. Vieraiana* Webb, syn. ined.«

uti appareat ex diagnosi et loco natali:

»foliis petiolatis lanceolatis acuminatis basi cuneatis irregulariter «
»acute dentatis saepe auriculatis, panicula regulariter ramosa ramulis
»alternis apice dichotomis filiformibus, petalis calyce longioribus, ovarii; «
»(gravid) articulo superiore orbiculari toto rugosissimo valide costato «
»costis in stylum brevem productis, supra inferiorem brevem sessili.«

»Hab. Canaria mont. Saucillo (Despr.) Tenteniguada (Bourg.) nomen «

»in honorem Josephi Viera y Clavijo historiographi, Canaria oriundi, plan-«
»tarum cat. manu scripti auctoris.«

»Cr. Gomeraea Webb, syn. ined.«

»foliis petiolatis lanceolatis acutis irregulariter argute dentatis strigo-«
»sissimis basi cuneatis, paniculae ramulis nudis erectis strictis floribus«
»conspicuis cymosis, petalis calyce longioribus ovarii (gravidii), articulo
»superiore costato, inter costas leviusculo stylo brevi crasso costato supra«
»inferiorem brevem subsessili.«

»Hab. Gomera ad rupes el Risco de Tagamiche 5. Ap. 1845 (Bourg.)

»Cr. arborea Webb, syn. ined.«

»foliis petiolatis anguste lanceolatis longe acuminatis laciniatis et «
»laciniato-dentatis, dentibus acutis integerrimis, basi decurrentibus «
»auriculatis strigosis, panicula ramosissima ramulis tenuibus, petalis «
»calyce duplo longioribus, ovarii gravidii articulo inferiore subnullo, su-«
»periore orbiculari-ovato 4 costato costis styloque alatis.«

»Hab. Teneriffa ad juga Ladera de Guimar caulis Euphorbiae «
»canariensis a morsu caprarum tutata fl. 30. Mai 1846 (Bourg.).«

Cr. strigosa Hérit. in syn. ined. hac diagnosi illustratur, quae
comparationis causa cum antecedentibus addatur:

»foliis petiolatis ovatis vel oblongo-ovatis acutis basi cordatis saepe «
»auriculatis irregulariter crenulato-dentatis strigosis, paniculae ramis «
»intricatissime dichotomis, petalis calyce sublongioribus articulo superiore «
»ovato-sublageniformi costis 2 in stylum longiusculum productis, inter «
»costas rugoso, supra inferiorem cylindraceum breviter stipitato.«

»Hab. In sylvosis et convallibus umbrosis Teneriffae et Palmae.«

Dicendum est cl. Askenasy e Gr. Canaria reportasse specimina quoad folia inter
Cr. strigosam L'Hérit. et C. Pritzelianam Bolle quasi intermedia.

»Cr. laevigata DC. mss. in herb. Fontanesiano.«

»foliis ovato-lanceolatis acutis irregulariter dentato-sublaciniatis, «
»dentibus latis integerrimis vel subdentatis basi edentulis, sessilibus «
»vel in petiolum brevissimum latere praesertim altero decurrentibus, «
»paniculae ramis patentibus nudis, ovario (innupto) 4 angulato inter an- «
»gulos laevi.«

»Hab. In insulis Canariensis (Brouss.).«

Cakile Scop.

C. maritima Scop.

»Hab. Fuerteventura Playa blanco prope opp. Puerto cabras. Lanze- «
»rotte in scopolu ex adverso portus Arrecife (Bolle).«

Fumariaceae.

Fumaria L.

Additamenta synopsis a cl. Kralik redacta haec sunt:

»F. officinalis L.«

»Hab. in ins. Canar.«

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 93]

Spicilegium canariense, 93

»Ex spec. Vogelianis quae sola mihi in herb. supersunt nimium deformibus loculi «

»semper 4-spermi.«

»Hab. In Ins. S. Vincent (Th. Vogel).«

»*K. fruticosa* Webb, syn. ined.«

»frutex ramis divaricatis foliis oppositis alternis yue lanceo-«

»latis basi attenuatis petiolatis apice acutis glandula obtusa mucronatis «

»glabrescentibus, petalis calyce 2 plo longioribus, lamina orbiculata «

»erosa, staminibus brevioribus basi intus ampliatis, staminum breviorum «

»glandulis brevissimis, longiorum maximis filiformibus, stylo ovarii ovati«

»longitudine, siliculis subrotundo- ovatis 1 spermis.«

»Hab. Ins. S. Nicolai vall. Ribeira Brava (Bolle) fl. lactei. Haec est«

»species procera et a priore forsan distinguenda quam in herb. mus. Paris.«

»visam in annotatione spic. gorg. l. cit. praenuntiavi.«

Alyssum L.

A. campestre L.

»Hab. Inter pumices montis Nublo Canar. (Bourg.).«

Lepidium L.

L. procumbens L.

Hab. Orotavae J. Hillebrand.

Iberis L.

I. odorata L.

»Hab. Canaria: Tenteniguada (Despr.) .«

Isatis L.

I. tinctoria L.

»var. hirsuta DC.«

»Hab. In rupibus S. Petri ins. Hierro (Bourg.)«

Carrichtera DC.

C. Vellae DC.

Hab. Teneriffae prope La Paz Orotavae I. Hillebr. unicum specim. pr.

S. Cruz Masferrer recuerd. 349 aequo unum specim. »Canaria (Despr.)

Fuerteventura penins. Handia et Ins. Lobos (Bolle).«

Crambe L.

Sect. *Dendrocrambe* Webb.

Cr. Pritzelii C. Bolle in Append. plant. nov. Hort. Berol. 1864,

cui synonyma

»Cr. *Vieraeanana* Webb, syn. ined.«

uti appareat ex diagnosi et loco natali:

»foliis petiolatis lanceolatis acuminatis basi cunealis irregulariter «

»àcute dentatis saepe auriculatis, panieula regulariter ramosa ramulis

»alternis apice dichotomis filiformibus, petalis calyce longioribus, ovarii«

»(gravidi) articulo superiore orbiculari toto rugosissimo valide costato«

»costis in stylum brevem productis, supra inferiorem brevem sessili.«

»Hab. Canaria mont. Saucillo (Despr.) Tenteniguada (Bourg.) nomen«

[Begin Page: Page 94]

94 H. Christ.

»in honorem Josephi Viera y Clavijo historiographi, Canaria oriundi, plan- «

»tarum cat. manu scripti auctoris.«
»Cr. Gomeraea Webb, syn. ined.«
»foliis petiolatis lanceolatis acutis irregulariter argute dentatis strigo- «
»sissimis basi cuneatis, paniculae ramulis nudis erectis strictis floribus«
"conspicuis cymosis, petalis calyce longioribus ovarii (gravidi), articulo
»superiore costato, inter costas leviusculo stylo brevi erasso costato supra«
» inferiorem brevem subsessili.«

»Hab. Gomera ad rupes él Risco de Tagamiche 5. Ap. 1845 (Bourg.)

»Gr. arborea Webb, syn. ined.«

»foliis petiolatis anguste lanceolatis longe acuminatis laciniatis et«
»laciniato- dentatis, dentibus acutis integerrimis, basi decurrentibus«
»aurieulatis strigosis, panicula ramosissima ramulis tenuibus, petalis«
» calyce duplo longioribus, ovarii gravidi articulo inferiore subnullo, su-«
» periore orbiculari-ovato 4 costato costis styloque alatis.«

»Hab. Teneriffa ad juga Ladera de Guimar caulibus Euphorbiae «

»eanariensis a morsu caprarum tutata fl. 30. Mai 1846 (Bourg.).«

Cr. strigosa Hérit. in syn. ined. hac diagnosi illustratur, quae

comparationis causa eum antecedentibus addatur :

»foliis petiolatis ovatis vel oblongo-ovatis acutis basi cordatis saepe«
»auriculatis irregulariter erenulato- dentatis strigosis, paniculae ramis«
» intricatissime dichotomis, petalis calyce sublongioribus artieulo superiore«
»ovato-sublageniformi eostis 2 in stylum longiusculum productis, inter«
»costas rugoso , supra inferiorem cylindraceum breviter stipitato.«
»Hab. In sylvosis et convallibus umbrosis Teneriffae et Palmae.«

Dicendum est cl. Askenasy e Gr. Canaria reportasse specimina quoad folia inter
Cr. strigosam L'Hérit. et C. Pritzelianam Bolle quasi intermedia.

»Cr. laevigata DC. mss. in herb. Fontanesiano.«

»foliis ovato-lanceolatis acutis irregulariter dentato- sublaciniatis, «
»dentibus latis integerrimis vel subdentatis basi edentulis, sessilibus«
»vel in petiolum brevissimum latere praesertim altero decurrentibus, «
» paniculae ramis patentibus nudis, ovario (innupto) 4 angulato inter an-«
»gulos laevi.«

»Hab. In insulis Canariensis (Brouss.)«

Cakile Scop.

C. maritima Scop.

»Hab. Fuerteventura Playa blanco prope opp. Puerto cabras. Lanze-«

»rotte in scopulo ex adverso portus Arrecife (Bolle).«

Fumariaceae.

Fumaria L.

Additamenta synopsis a cl. Kralik redacta haec sunt:

»F. officinalis L.«

»Hab. in ins. Canar.«