



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Florae siculae synopsis, exhibens plantas vasculares in
Sicilia insulisque adjacentibus huc usque detectas
secundum systema Linneanum dispositas**

Neapoli, Ex Typis Tramater, 1842-[1845]

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/50455>

v.2: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/106545>

Page(s): Title Page, Page 636, Page 637, Page 638

Holding Institution: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz
Library

Sponsored by: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical
Garden

Generated 2 October 2024 5:44 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1739758i00106545.pdf>

This page intentionally left blank.

FLORAE SICULAE

SYNOPSIS

EXHIBENS

PLANTAS VASCULARES IN SICILIA INSULISQUE ADJACENTIBUS
HUC USQUE DETECTAS

SECUNDUM SYSTEMA LINNEANUM DISPOSITAS

AUCTORE

JOANNE GUSSONE

VOL. II.

PARS I.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

NEAPOLI

EX TYPIS TRAMATER
MDCCCXLIII.

1843

T A X U S.

Endl. gen. n. 1799.

Flor. (in hac) axillares — *Masc.* *Calycis* loco bractee plures imbricatae. *Cor.* nulla. *Filam.* coalita in columnam bracteis longiorem; *antheris* peltatis, depressis, subtus 6-8 loculis dehiscentibus — *FOEM.* solitarii, praeter bracteas, disco minimo integro et annuliformi cincti. *Cor.* nulla. *Styl.* nullus; *stigmatibus* obtuso, concavo. *Sem.* unicum, nucamentaceum, disco demum aucto superne hiante et baccam mentiente laxè involutum. (*Arbor* elata, glaberrima, sempervirens; ramis patulis: *folia* coriacea, anguste lineari-lanceolata, integerrima, exstipulata, approximata. *Taxineae Rich.*)

1. *T. BACCATA.* *Lin. sp. pl.* 1472 — *Ueria H. Pan.* p. 421.

T. foliis approximatis distichis planis acutis brevissime petiolatis, floribus axillaribus sessilibus.

Ic. Lam. ill. gen. t. 829 — *Duham. arb. ed. 2. v. 1. t.* 19 — *Taxus. Dod. pempt.* 859.

In nemoribus Siciliae septentrionalis locis frigidioribus nonnihil rara; *Bosco di Caronia, e di Mistretta nel luogo detto la Tassita; Etna (Cosentini).*

Januario, Februario. \bar{h}

Arbor ramosissima, obscure virens; ramis sparsis vel oppositis, ramulis pendulis: *folia* rigidiuscula, subtus pallidiora, fere pollicaria, lin. lata: *flores* deorsum versi, et a foliis occultati: *bractee* flores involucrantes obtusissimae, arte imbricatae, virentes, brevissimae, intimae scariosae ac albidae: *columna* staminifera crassiuscula, alba, filamentis apice brevi tractu liberis; *antheris* sordide albidis, in centro depressis, dejecto polline planis, margine octofidis: *ovarium* virescens, glabrum; *stigmatibus* vix a bracteis exserto, subpentagono, albido-virenti: *fructus* facti ex disco carnosio baccam mentiente, subsessiles, glaberrimi, amoene coccinei, ovaes, basi bracteis persistentibus calyciformibus suffulti, apice foveola campanulata aperta, in qua *semen* ovale compressiusculum fuscum nidulatur.

Columna staminifera pro amento a recentioribus describitur.

E P H E D R A.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1554 — Endl. gen. n. 1804.

Ament. ex squamis 4-fariam imbricatis basi connatis composita, floribus in illarum axillis solitariis — *Masc.* *Cal.* 2-fidus, compressus, membranaceus. *Cor.* nulla. *Stam.* *filam.* coalita, apice libera; *antheris* 2-4-ocularibus, poro oblongo dehiscentibus — *FOEM.* *Cal.* 2-partitus. *Cor.* nulla. *Pist.* 2, exerta; *stigmatibus* simplicibus. *Sem.* duo calyce et squamis demum auctis ac succulentis et baccam spuriam mentientibus inclusa. (*Frutices* aphylli, ramosissimi; ramis teretibus, tenuissime striatis, saepe fasciculatis, sar-

mentosis, articulatis, ad articulos vagina squamaeformi brevissima instructis: *habitus Equiseti. Ephedrineae Nees ab Es.*).

1. *E. FRAGILIS*. Desf. atl. 2. p. 382, ex ejus herb! — Willd. sp. pl. 4. p. 860.

E. articulis ramorum secedentibus, vaginis monophyllis brevibus acute vel obtusiuscule 2-4-dentatis, amentis masculis pluribus sessilibus aggregatis.

lc. Equisetum montanum, creticum. Alp. exot. p. 140, pl. foemina — Polygono baccifero minori similis florida, sed infructifera. Cup. panph. 2. t. 222, pl. masc.

In arenosis, et rupestribus maritimis; *Sferracavallo, Scopello, Castellammare, da Cofani a Martogna nelle basse falde del monte di Trapani, Butera, Biscari, da Girgenti a Spaccaforno; Marsala e Niscemi (Tin.)*.

Aprili, Majo. h

Caules lignosi; inter frutices in arenosis maritimis (*Girgenti*) alte et implexe scandentes, virentes, adulti fusci; ramis saepe pluribus ex eodem nodo: *vaginae* in plantis masculis acute 4-dentatae, albidae, vix lin. longae; in plantis foemineis breviores, obtuse bidentatae, ut in ramis adultis, in quibus demum oblitteratae: *amenta* mascula numerosissima, sessilia, lutescentia, fere globosa; foeminea aliquando solitaria, brevissime pedunculata, ovali-oblonga; *squamis* in tubum connatis, obtusissimis: *fructus* immaturi caesio-pruinosi, ovaes, maturi globosi ac rubentes.

2. *E. DISTACHYA*. Lin sp. pl. 1472 — *Ucria H. Pan. p. 421*.

E. ramulorum articulis non secedentibus, vaginis monophyllis brevibus obtuse 2-dentatis, amentis masculis numerosis racemoso-glomeratis pedunculatis, pedunculis amento brevioribus vel illa aequantibus, foemineis solitariis oppositis pedunculatis.

lc. Polygonum iv Plinii, minus. *Clus. hist. 1. p. 92!* nostram plantam masculam exacte exhibentem quoad pedunculos — P. marinum ii. *Tabern. ic. 856, ic. ex Clus.* — *Tragus*, sive *Uva marina. Bauh. hist. 1. par. 2. p. 406, pl. masc. et foem.* — *Vua marina Monspeliensium. Lob. ic. 1. p. 796, pl. masc.* — P. fruticans, botryoides, majus, hispanicum. *Barr. ic. 752. n. 3, ic. etiam ex Clus.* — P. fruticans botryodes, narbonense, minus. *Barr. l. c. 751 n. 2, pl. foem.* — *Equiseti* facie, racemosa planta, *Vua marina Monspeliensium. Moris. hist. 5. s. 15. t. 5, ic. ex Clusio.*

In arenosis maritimis Siciliae septentrionalis; *marina di Caronia, di S. Stefano, Terranova sotto S. Agata; rupi del Capo di Milazzo (Tin.)*.

Martio, Junio. h

Frutex 2-3-pedalis; ramis erectis, firmis, ut plurimum numerosis ab eodem nodo, ad strias sub lente tuberculis minutis obsiti: *vaginae* albidae, vix lin. longae: *spicae* masculae brevissime pedunculatae, imo fere sessiles, ut in speciminibus monspeliensibus quae coram habeo, vel in pedunculo 2-5-lineari glomerato-pyramidatae, sicut in iconibus citatis, et praesertim in illa *Clusii* optime exhibentur: *foemineae* vero pedunculo 2-3-lineari suffultae, et solitariae: *fructus* globosi, rubentes.

Icon Polygonum av Plinii, majus. *Clus. hist. 1. p. 92. f. 1*, quae ab auctoribus plurimis sub hujus speciei individuo foemineo citatur, ad aliam plantam spectare olim monuit Cl. *Lagasea*, quam ipse *E. arboream* appellare proposuit; perinde optime a Cl. *Host* in *fl. austr. 2. p. 671*, quem confer, *E. majoris* nomine describitur, et ab *E. distachya*, (qua *E. minor* ejusdem) probe di-

stinguitur; tamen nomen *Lagascae* prioritatis jure servandum. Haec in Hispaniae locis a mare dissitis (*Aranjuez*) provenit, ubi sine floribus collegi, et habitu firmiore, ramis magis exasperatis confertissimis longioribusque, aliisque notis ab *E. distachya*, uli jam laudati auctores monuerunt prorsus aliena.

3. *E. NEBRODENSIS*. *Tin.*

E. ramulorum articulis subsecedentibus gracilibus numerosis confertis, vaginis monophyllis obtusiuscule 2-dentatis, amentis omnibus sessilibus, masculis numerosis solitariisve, foemineis solitariis oppositis sparsisque.

Equisetum nebrodense, fruticosum, duris setis, flosculis luteis, stiptici acuti aromatici saporis, seu Polygono maritimo minori similis lutea florida, sed infructifer. *Cup. H. Cath. p. 62*, et — *Tragus*, sive *Uva marina*, major. *Cup. l. c. supp. alt. p. 89*.

ic. nulla.

In lapidosis montosis; *Madonie a Scalamadaggio*; *alla Colma grande* (*Gaspar.*); *nella vallata che scende ai Favari d' Isnello* (*Tineo*).

Majo, Junio. $\frac{1}{2}$

Caules varie torti, teretes, 1-1 $\frac{1}{2}$ pedales, diametro 3-4-lineari; sed *rami* graciles, fere filiformes, dense conferti, magis quam in antecedente scabri, exsiccatione nonnihil fragiles: *amenta* mascula duplo quam in praecedente minora, semper sessilia: *fructus* maturos non vidi.

Nomine *E. fragilis* ex Dalmatia a Cl. *Visiani* accepi plantam huic similem quoad flores et gracilitatem ramorum, sed isti minime sunt ut in nostra conferti; an haec *E. arborea* Lag.?, sed habitus gracilior quem in planta hispanica.

RUSCUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1559 — Endl. gen. n. 1188.

Flor. in medio foliorum inserti, subsolitarii — *Masc. Cal.* corollinus, 6-sepalus; *sepalis* patentibus, persistentibus; inferioribus minoribus. *Cor. nulla. Filam.* in tubum (*Nect. Lin.*) ventricosum connata, ad cujus apicem *antherae* 5 reniformes adnatae — *FOEM. Cal. Cor.*, ac tubus stamineus ut in masculis, sed iste antheris sterilibus instructo. *Styl. 1*; *stigmatibus* capitato, extra tubum prominente. *Bacc.* globosa, 3-ocularis; loculis dispermis; abortu 1-ocularis et submonosperma. (*Suffrutex humilis*, sempervirens, glaberrimus: *folia* coriacea, simplicia, integerrima, alterna, exstipulata, in medio florifera: *flores* parvi. *Smilaceae Brown.*),

1. *R. ACULEATUS*. *Lin. sp. pl. 1474 — Ueria H. Pan. p. 422.*

R. caule supra medium ramoso, foliis sessilibus ovatis vel elliptico-lanceolatis mucronato-pungentibus supra floriferis, fasciculis subbifloris basi bractea minuta scariosa suffultis.

Ruscus. Cup. H. Cath. p. 194 — Cast. H. Mess. p. 20.

ic. Lam. ill. gen. t. 855 — Bull. herb. t. 245 — Ruscus. Malth. comm. 2. p. 555 — Ruscum. Dod. pempt. 744.

In sylvis apricis, in dumetis, et ad saepe passim in Sicilia.

Martio, Aprili. $\frac{1}{2}$

Radices albae, fasciculato-fibrosae, dense caespitosae: *caules* plures ex eadem radice, 1-2-pedales, superne ramosi ac striati; ramis

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

?LORAE SICULAE

SYNOPSIS

EXIHIBENS

"LUGAS VASQULARES IX SICILIA INSULISQUE ADJACENTIBUS
HU(USQUE DETEGTAS

SECUNDUM SYSTEMA LINNEANUM DISPOSITAS

AUCTORE

JOANNE GUSSONE

FOL. 1L.

PARS I,

AmmamTv
mv vvv
px) am x!

«Aw

NEAPOLI

EX TYPIS TRAMATERXR
MDCCCXLIIT.

[Begin Page: Page 636]

636 DIOECIAÀ - MONADELPHIA.

TAXUS.

Endl. gen. n. 1799.

Flor. (in hac) axillares — J4. «sc. Calycis loco bractee plures imbricatae. Cor. nulla. Fz/am. coalita 1n columnam bracteis longiorem ; antheris peltatis, depressis, subtus 6-8 loculis dehiscentibus— Foz». solitarii , praeter bracteeas, disco minimo integro et annuliformi cincti- Cor.nulla.\$/y/. nullus ; stigmale obtuso, concavo. Sem. unicum, nucamentaceum, disco demum aucto superne hiante et baccam menliente laxe involutum. (Arbor elata , glaberrima , sempervirens ; ramis patulis: fo/a coriacea, anguste lineari-lanceolata, integerrima, exstipulata , approximata, 7'zzneae Rich.)

4. T. zaccara. Lin. sp. pl. 1472 — Ueria H. Pan. p.421.

T. folis approximatis distichis planis acutis brevissime petiolatis ,
floribus axillaribus sessilibus.]

Ic. Lam. iil. gen. t. 629 — Duham. arb. ed. 2. v. 1.1.19 — Taxus.
Dod. pempl. 839.

In nemoribus Siciliae septentrionalis locis frigidioribus nonnihil rara

Bosco di Caronia , e di Mistretia nel luogo detto la Tassita
Etna (Cosentinz).

Januario , Febuario. fj.—

-Arbor ramosissima , obscure virens ; vagis sparsis vel oppositis, ramu-
lis pendulis : fo/za rigidiuscula, subtus pallidiora, fere pollicaria, lin,
lata : f/ores deorsum versi, et a folis occultati: bractee flores
involucrantes obtusissimae, arcte imbricatae, virentes , brevissimae,
inlimae scariosae ac albidae : eo/umna staminifera crassiuscula, al-
ba, filamentis apice brevi tractu liberis ; an/Aerzs sordide albidis,
in centro depressis , dejecto polline planis , margine octofidis : o-
varium virescens , glabrum ; s/zgmate vix a bracteis exserlo, sub-
penlagono , albedo-virenti : fructus facli ex disco carnoso baccam
mentiente , subsessiles , glaberrimi , amoene coccinei, ovaes, basi
bracteis persistentibus calyciformibus suffulti , apice foveola cam-
panulata aperia , in qua semen ovale compressiusculum fuscum
nidulatur.

Columaud staminifera pro amento a recentioribus describitur.

"qq w*

EPHEDR A.

Gen, pl. ed. Schreb. n. 1334 — Endl. gen. n. 4804.

Amenl. ex squamis 4-fariam imbricatis basi connatis composita, flo-
ribus in illarum axillis solitariis — JMa4sc. Cal. 2-fidus, . com-
pressus, membranaceus. Cor. nulla. Stag. filazm. coalita, apice li-
bera; antheris 2-A-loeularibus, poro oblongo dehiscentibus— Foz .
Cal. 2-parüiius. Cor. nulla. Pzsi. 2, exerta ; stigmatibus simpli-
Cibus. Se;. duo calyce et squamis demum auctis ac succulentis
et baccam spuriam meniientibus inclusa. (F'ratces aphylli , ramo-
sissimii ; ramis ierelbus , Lenuissune sirialis, saepe fasciculauis; sar-

[Begin Page: Page 637]

DIOECIA - MONADELPHIA, 631

mentosis ; articulatis , ad articulos vagina squamaeformi brevissi-
ma instructis: Aab?tus Equiseti. Ephedrineae INees ab Es.).

4. E. rnaclLtS. Desf. atl. 2. p. 982, ex ejus Aerb/ — JF'illd. sp. pl.
4. p. 860.

E. Meruta ramorum secedentibus, vaginis monophyllis brevibus acutis vel obtusiuscule 2- & 4-dentatis, amentis masculis pluribus sessilibus aggregatis.

lc. Equisetum montanum, crelicum. 4p. exot. p. 440, pl. foemina — Polygono baccifero minori similis florida, sed infruclifera. Cup. panph. 2. t. 222, pl. masc.

In arenosis, et rupestribus maritimis; Sferreaevalllo, Scopello, Ga-Stellammare, dà Cofani a Martogna nelle basse falde del monte dz T'rapant, Butera, B'scari, da Girgenti à Spaccaforno; Marsala e IViscemi (Tn.).

Aprili, Majo. fi.

Caules ignosi; inler frutices in arenosis maritimis (Girgenti) alte et implexe scandentes, virentes, adulti fusci; ramis saepe pluribus ex eodem nodo: zagznae in plantis masculis acute 2-dentatae, albae, vix lin. longae; in plantis foemineis breviores, obtuse bidentatae, ut in ramis adultis, in quibus demum oblitteratae: «menia mascula numerosissima, sessilia, lutescentia, fere globosa; foeminea aliquando solitaria, brevissime pedunculata, ovali-oblonga; squamis in tubum connatis, obtusissimis: fructus immaturi caesio-pruinosi; ovaes, maturi globosi ae rubentes.

2. E. nigracnra. Lin sp. pl. 4472 — Ueria H. Pan. p. 494.

E. ramulorum articulis non secedentibus, vaginis monophyllis brevibus obtuse 2-dentatis, amentis masculis numerosis racemoso-glomeratis pedunculatis, pedunculis amento brevioribus vel illa aequantibus, foemineis solitariis oppositis pedunculatis.

le. Polysonum 1v Plinii, minus. C/us. Just. 4. p. 92 / nostram plantam masculam exacte exhibentem quoad pedunculos — P. marinum un. Z'abern. 2c. §36, ic. ex Clus. — 'Vragus, sive Uva marina. Zauh. Ast. 4. par. 2. p. 406, pl. masc. et foem. — Vva marina Monspeliensium. Zob. zc. 4. p. 796, pl. masc. — P. fruticans, botryoides, majus, hispanicum. Zarr. 2e. 752. m. 2, ic. etiam ex Clus. — P. fruticans botryodes, narbonense, minus. Barr. 4. c. 751 7. 2, pl. foem. — Equiseti facie, racemosa planta, Vva marina Monspeliensium. /orzs. Ast. 9. s. 43. t. à, 1c. ex Clusto.

In arenosis maritimis Siciliae septentrionalis; znarzug. d£ Caronza, dz S. Stefano, T'erranova solito S. 4gata; vujé del Capo di Milazzo (fn.).

Martio, Junio. h,

J'ruix 2-)pedalis; ramis erectis; firmis, ut plurimum numerosis ab eodem nodo, ad strias sub lente tuberculis minutis obsiti: vaginae albae, vix lin. longae: spécae masculae brevissime pedunculatae, imo fete sessiles, ut in speciminibus monspeliensibus quae coram habeo, vel in pedunculo 2-5-lineari glomerato-pyramidalae, sicut in iconibus citatis, et praesertim iu illa C/usz optime exhibentur: foemineae vero pedunculo 2-3-lineari suffultae, et solitariae: fructus globosi, rubentes.

icon Polygonum »v Plinii, majus. C/us. Aist. 4. p. 92.f. 4, quae ab auctoribus plurimis sub hujus speciei individuo foemineo citatur, ad aliam plantam spectare oim monuit Cl. Lagasca, quam ipse E. arboream appellare proposuit ; perinde optime a Cl. ost in ff. austr. 2. p. 671 , quem conler, E. majoris nomine describur; et ab E. distachya , (qua E. minor ejusdem) probe di-

[Begin Page: Page 638]

638 DIOECIA * MONADELPHIA.

stnguitur; tamen nomen Zagascae prioritatis jure servandum.

Ilaec in Hispaniae loeis a mare dissitis (Aranjuez) provenit , ubi

sine floribus collegi , et habitu firmiore, ramis magis exasperatis

confertissimis longioribusque , aliisque notis ab E. distacAya , uli

jam laudati auctores monuerunt prorsus aliena.

3. E. wzbRODENSIS. Tia.

E. ramulorum arūculis subsecedentibus gracilibus numerosis conferlis , vaginis monophyllis obtusiuseule 2-dentatis , amentis omnibus sessilibus , masculis numerosis solitariisve , foemineis solitariis oppositis sparsisque.

Equiselum nebrodeuse , fruticosum , duris setis , flosculis luteis , stiplici acuti aromatici saporis , seu Polyzgono maritimo minori similis lutea florida , sed infructifer. Cup. H. Cath. p. 62 , et — Tragus, sive Uva marina, major. Cup. l. c. supp. alt. p. 89.

le. nulla.

in lapidosis montosis ; Madonie a Scalamadagto 5 alla Colma grande (Gaspar.); nella vallata che scende ai Favart d' Isneillo (Tineo).

Majo. Junio. f

Xaules varie tori , teretes, 1-1 7/ pedales, diametro 3-A4-lineari ; sed ram: graciles , fere filiformes , dense conferti , magis quam in antecedente scabri, exsiccatione nonnihl frasiles : amentia mascula duplo quam in praecedente minora, semper sessilia : fruciús maturos non vidi.

Nomine £.fragilis ex Dalmatia a Cl. Jzszan? accepi plantam huic similem quoad flores et gracilitatem ramorum, sed isti minime. sunt ut in nostra conferti ; an haec E. arborea Lag-?, sed habhius gracilior quem in planta hispanica,

RUSCUS.

Gen. pi. ed. Schreb. n. 4559 — Endi- gen. n. 4488.

"Fior. in medio foliorum inserti , subsolitarii — 7Mzsc. Cal. corollinus , 6-sepalus ; sepalis patentibus, persistentibus ; inferioribus minoribus. Cor.nulla. Flam. in tubum (Nect. L:m.) ventricosum connaia, ad cujus apicem antherae 5 reniformes adnatae — Foz». Cal. Cor.,ac iubus stamineus ut in masculis, sed isle antheris sterilibus instructo. Syl. 4; siigmate capitato , extra tubum proziente. Zaec. globosa , 3-ocularis; locuiis dispermis ; abortu 1-ocularis et submonosperma. (Suffruter humilis, sempervirens , slaberrimus: folia Coriacea , simplicia, integerrima, alterna , exsüpulata, in medio florifera : flores parvi. SmuUaceae Brown.).

3, B. acvzEazvs. Lin.sp. pl. 4474 — Ueria H. Pan. p. 422.—

B. caule supra medium ramoso , foliis sessilibus ovatis vel elliptico-lanceolatis mucronato-pungentibus supra floriferis , fasciculis subbifloris basi bractea minuta scariosa suffultis.

fuscus. Cup. H. Caih. p. 194 — Cast. H. Mess. p. 20.

Ac. Lam. ill. gen. t. 833 — Buil. herb. t. 243 — Buseus. Maii. comm. 23.p.535 — Ruscum. Dod. pempt. 744. —

in sylvis apricis , in dumelis , et ad saepe passim in Sicilia

Martio , Aprili. f

fladices albae , fasciculalo-fibresae, dense caespilosae : eau/es plures £X €adom radice , 1-2-pediles , superne ramosi ac stri; ram's