

HISTOIRE NATURELLE

I  
35

DES

PHOTOGRAPHIA CANARIENSIS  
**ILES CANARIES,**

PAR

MM. P. BARKER-WEBB ET SABIN BERTHELOT,

Membres de plusieurs Académies et Sociétés savantes;

OUVRAGE PUBLIÉ SOUS LES AUSPICES

*De M. le Ministre de l'Instruction Publique.*

TOME TROISIÈME.

Deuxième partie.

PHYTOGRAPHIA CANARIENSIS.

SECTIO III.



PARIS,

BUREAUX : RUE PAVÉE-SAINTE-ANDRÉ-DES-ARTS, 47.

MDCCLXXXVI-L.

## GNETACEÆ. BLUME.

### EPHEDRA. LINN.

ENDLICH., *Gen. pag.* 263. — TH. NEES, ab *Es. Gen. germ.*

#### 1. EPHEDRA EQUISETIFORMIS. NOB.

E. frutex decumbens, ramis crassis nodosis, ramulis plurimis, gracilibus, confertissimis, brevibus, tenacibus, obsolete striatis, levibus, acutis; foliis in vaginam longam, cylindraceam, utrinque coloratam, persistentem, 2-dentatam, dentibus acutis vel obtusis, connatis; floribus masc... fem. oppositis, pedunculatis, erectis, bracteis ovatis, acutis, subscariosis, albidis, fructu (immature) ovato-elliptico.

HAB. Frutex est rupestris regionis Alpine seu Teydensis. Specimina nostra legimus ad fontem rosæ Arnidæ, alia ad pylas excelsas *la Degollada del Cedro* dictas in rupibus montis *la Fortaleza*, florida legit cl. Bourgeau d. 19 maii 1846.

DISTR. GEOGR. Species est Canariensis.

Obs. Differt ab *E. distachyæ* ramulis gracilibus vix striatis, confertis, foliorum vaginis elongatis diu persistentibus, bracteis coriaceis albidis subscariosis, fructu elliptico nec ovato, ab *E. denique majore* Host., cui rami confertiores, vaginis omnino diversis.

#### 2. EPHEDRA DISSOLUTA. NOB.

E. frutex ramosus, ramulis plurimis ex eodem nodo prodeantibus, robustis, fragilibus, ad articulos secedentibus; foliorum vaginis brevissimis, curtis, sub-2-dentatis; floribus masculis..., fem. ad articulos fasciculatis, longè pedunculatis, pedunculis bracteolarum vaginis crebris brevibus circumscissis sese mutuò recipientibus, stipatis; fructu (immature) angusto, cylindraceo.

HAB. In fissuris rupium jugi montium *la Risbala* dicti quod vallem Orotavensem ad occidentem claudit propè pagum *Tigayga*.

DISTR. GEOGR. Stirps esse Canariensis videtur.

Obs. Differt ab *E. fragilis* Desf., cui nimiam forsitan affinis floribus feminicis longè pedunculatis et foliorum vaginis curtissimis.