

Linaceae.**Linum L.**

L. usitatissimum L.

»*B. ramosum* Webb, synops. (*L. Teneriffae* Hoffmans. Verz. 2. 450).«

Hab. Icod el Alto l. Hillebr. et ego! cultum, caulis e medio corymboso - ramosis capsula maxima.

Caryophyllaceae.**Dianthus L.**

»*D. velutinus* Guss.«

»Hab. ad margines agrorum.«

Silene L.

»*S. vespertina* Retz.«

»caule pubescente ramoso foliis spathulatis, obtusis, calycibus vesiculato-clavatis, petalis 2 partitis.«

»Hab. in ins. Can. Brouss. in herb. DC.«

»*S. longicaulis* Pourr.«

»Hab. in campus Lanzerottae prope Mala (Bourg.).«

»*S. cretica* L.«

»Hab. Gomera in arvis lino consitis (Bourg.).«

»*S. muscipula* L.«

»Hab. Fuerteventura: Betancuria, valle de Garabato (Bolle).«

»*S. nutans* L.«

»*v. Broussonetiana* Webb, syn. ined. (*S. Broussonetii* Schott in H. «

»Desf.) fol. ovatis glabris virentibus, paniculae ramis saepe abbreviatis «

»calyce viridi-nervoso.«

»Hab. s. i. l.«

»*S. Berthelotiana* Webb, syn. ined.«

»caule elongato pubescente, basi lignescente? foliis lanceolatis apiculatis molliter pubescens, racemo laxo floribus breviter pedicellatis «

»subnutantibus, calyce plicato-nervoso glanduloso-pubescente, dentibus «

»ovatis late scariosis obtusis petalis 2 fidis laminis anguste obovatis ad «

»faucem squamis 2 oblongis 2—3 dentatis vel 2—3 fimbriatis auctis, «

»capsula . . . «

»Hab. In abruptis convallis Añavigo prope Arafo in Teneriffa (Bourg.)

»fl. ex sicco rosei antheris purpurascensibus.«

»*S. Bourgaei* Webb in Sched. Bourg. I, 744 «

»caule brevi contracto basi lignescente foliis lanceolatis vel ovato-lanceolatis apiculatis villoso-pubescentibus, vel glabrescentibus tenuiter «

»ciliatis, racemis brevibus congestis, pedunculis brevibus erectis glandulosi «

»losi-puberulis, calyce fructifero ovato dentibus lanceolatis apice subulatis, «

»petalis 2 fidis lobis oblongis squamis 2 cultriformibus ad faucem «