



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas...

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

vol. 2: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13830>

Page(s): Title Page, Page 734, Page 735, Page 736, Page 737

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 15 March 2025 4:00 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1785699i00013830.pdf>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:ITIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS DE STELLA POLARI;

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS II.

Cum Privilegio S. R. Mitis Sueciæ & S. R. Mitis Poloniæ ac Electoris Saxon.

HOLMIÆ,

IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

Lathyrus foliis pinnatis, pedunculis multifloris. *Fl. lapp.* 221.

Lathyrus palustris, flore orobi nemorensis verni. *Rupp. jen.* 210. t. 1.

Vicia lathyroides f. Lathyrus viciæformis. *Pluk. alm.* 387. t. 71. f. 2

Habitat in Europæ borealis pascuis paludosis. &

pisiformis.

21. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis ovatis: basiacutis. *Hort. ups.* 217.

Habitat in Sibiria. &

Planta ut *Pisum crescens*. Caules acute angulati. Petioli cirrhosi, saepe hexaphylli: foliolis ovato-oblongis, acutis. Stipulæ foliis latiores, ovatae, basi acuminatae, vix angulatae. Pedunculi longitudine foliorum, multiflori. Flores violacei.

VICIA.

* *Pedunculis elongatis.*

pisiformis.

1. VICIA pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis: foliolis ovatis.

Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis cirrhosis, foliolis ovatis: infimis sessilibus. *Hort. cliff.* 369.*
Roy. lugdb. 365.

Pisum sylvestre perenne. Bauh. pin. 343.

Pisum sylvestre. Clus. hist. 2. p. 129.

Habitat in Pannoniæ sylvis. &

dametorum.

2. VICIA pedunculis multifloris, foliolis reflexis ovatis mucronatis, stipulis subdentatis.

Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis cirrhosis: foliolis alternis ovatis, stipulis dentatis. *Fl. suec.* 604. *Dalib. paris.* 219. *Sauv. monsp.* 234.

Vicia maxima dametorum. *Bauh. pin.* 385.

Vicia sylvatica maxima piso similiis. *Bauh. hist.* 2. p. 315.

Vicia sylvatica. *Riv. tetr.* 50.

Habitat in Thuringia, Gallia. &

sylvatica.

3 VICIA pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, stipulis denticulatis.

Vicia pedunculis multifloris, stipulis crenatis. *Fl. lapp.* 270. *Fl. suec.* 603. *Roy. lugdb.* 365. *Sauv. monsp.* 234.

Vicia multiflora maxima perennis, tetro odore, floribus

bus albensibus: lineis cæruleis notatis. *Pluk. alm.*

387. t. 71. f. 1.

Habitat in Sueciæ, Germaniæ, Galliæ sylvis. &

4. VICIA pedunculis subsexfloris, foliolis denis ovatis *castubica:*
acutis, stipulis integris.

Vicia pedunculis multifloris, caule fruticoso. Hort. cliff.

369. *Roy. lugdb.* 364.

Vicia multiflora castubica frutescens, siliqua lentis.

Pluk. alm. 387. t. 72. f. 2.

Habitat in Germania.

5. VICIA pedunculis multifloris, floribus imbricatis, fo- *Cracca.*
liolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris.

Vicia pedunculis multifloris, stipulis utrinque acutis in-
tegris. Hort. cliff. 368. *Fl. suæc.* 605. *Roy. lugdb.*

364. *Dalib. paris.* 220. *Sauv. monsp.* 234.

Vicia sylvestris spicata. Bauh. pin. 345.

Vicia multiflora. Bauh. pin. 343.

Cracca. Riv. tetr. 49.

Habitat in Europæ pratis, agris. &

6. VICIA pedunculis multifloris, floribus distantibus, fo- *onobrychid-*
liolis linearibus, stipulis inferne denticulatis. *des.*

Vicia pedunculis multifloris, stipulis crenatis, foliolis
linearibus. Sauv. monsp. 235.

Vicia onobrychidis flore. Bauh. pin. 345. *prodr.* 149.

Habitat in Gallia. D. Sauvages.

Statura Viciæ Craccæ. Folia pinnata, cirrhosa: foliolis
sepius 14, linearibus, angustissimis: oppositionibus di-
stantibus. Pedunculi axillares, foliis triplo longiores,
striati. Floribus 10. s. 12, subsessilibus, remotissimis,
Craccæ triplo majoribus, purpureis.

7. VICIA pedunculis multifloris, foliolis oblongis, stipu- *nissoliana.*
lis integris, leguminibus villosis ovato-oblongis.

Vicia leguminibus sessilibus binis ternisve subovatis nu-
tantibus, stipulis nullis. Roy. lugdb. 14?

Vicia orientalis, flore suave rubente, siliquis brevissimis.

Bærb. lugdb. 2. p. 44?

Habitat in Oriente.

Caulis sulcatus. Cirrhi foliolis 6 paribus, oblongis, vix
retusis, acumine terminatis, subvillosis. Stipulæ lanceo-
latæ, angustissimæ. Pedunculi floribus 5. s. 6, mini-
mis, atropurpureis. Legumina nutantia, compressa,
ovato-oblonga, villosa, pentasperma.

licentis.

8. VICIA pedunculis multifloris, petiolis sulcatis subdecaphyllis: foliolis lanceolatis glabris.

Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis: foliolis lanceolatis glabris. *Hort. ups.* 219. *

Habitat in Sibiria. ♂

benghalensis.

9. VICIA pedunculis subquinquefloris, foliolis integerrimis, stipulis integris, leguminibus erectiusculis.

Vicia pedunculis subquinquefloris longitudine foliorum.

Hort. cliff. 368. *Hort. ups.* 219. *Roy. lugdb.* 365.

Vicia benghalensis hirsuta & incana, filiquis pisi. *Herm. lugdb.* 623 t. 625.

Habitat in Benghala. ☉

* *Floribus axillaribus, subsessilibus.*

fativa.

10. VICIA leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliis retusis, stipulis notatis.

Vicia leguminibus erectis, petiolis polyphyllis: foliolis acumine emarginatis, stipulis denticulatis. *Hort. cliff.*

368. *Hort. ups.* 218. *Fl. suec.* 601. *Roy. lugdb.* 365.

Dalib. paris. 218.

Vicia fativa vulgaris, semine nigro. *Bauh. pin.* 344.

Vicia fativa alba. *Bauh. pin.* 344.

Habitat inter Europæ segetes hodie. ☉

Stipulae subtus macula quasi inusta notatae.

Lathyroides.

11. VICIA leguminibus sessilibus solitariis erectis glabris, foliolis senis: inferioribus obcordatis,

Vicia lathyroides, purpureo-cæruleis floribus. *Herm. par.* 242. t. 242.

Vicia montana minima, flosculo purpureo. *Amoen. acad.* 1. p. 167.

Habitat in Scotia, Lusatia. ☉

lutea.

12. VICIA leguminibus sessilibus reflexis pilosis solitariis pentaspermis, corollæ vexillis glabris.

Vicia foliis subsessilibus obverse ovatis apice emarginatis, leguminibus solitariis villosis. *Dalib. paris.* 219.

Vicia leguminibus solitariis deorsum flexis hirsutis. *Sauv. monsp.* 235.

Vicia sylvestris lutea, filiqua hirsuta. *Bauh. pin.* 345.

Vicia flore luteo pallido, filiquis hirsutis crassis brevibus propendentibus. *Moris. hist.* 2. p. 62. f. 2. t. 21. f. 5.

Habitat in Gallia.

Variat foliis lanceolatis & retusis, Leguminibus hirsutis & subglabris. Stipulae alternatim integerrimæ & tridentatæ.

13. VICIA leguminibus sessilibus reflexis pilosis penta-hybrida. spermis, corollæ vexillis villosis.
Habitat Monspeli, Massilia. ☉
Affinis *V. lutea*. Foliola obverse ovata, retusa, parva, pilis adpersa. Stipulæ non ad caulem fusca, sed totæ virides. Flores flavi, supra subgrisei, pilosi. Cætera *V. lutea*.
14. VICIA leguminibus subsessilibus pendulis glabris te-peregrina. traspermis, foliolis linearibus emarginatis.
Vicia peregrina angustissimis foliis, siliqua lata glabra.
Pluk. alm. 386. t. 233. f. 6.
Vicia angustifolia purpureo-violacea, siliqua lata glabra.
Magn. monsp. 276.
Habitat in Gallia. *D. Sauvages.* ☉
15. VICIA leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, *sepium.* foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decrescen-tibus.
Vicia leguminibus adscendentibus, petiolis polyphyllis, foliolis ovatis acutis integerrimis. *Hort. cliff.* 362.
Fl. suec. 602. *Roy. lugdb.* 365. *Dalib. paris.* 219.
Sauv. monsp. 234.
Vicia sepium, folio rotundiore acuto. *Baub. pin.* 345.
Vicia sepium. *Riv. tetr.* 56.
Habitat in Europæ sepiibus. ♀
16. VICIA leguminibus subsessilibus solitariis erectis, fo-narbonensis. liolis senis subovatis, stipulis denticulatis. *Hort. upf.* 218. *Sauv. monsp.* 234
Vicia petiolis inferioribus tetraphyllis: superioribus po-lyphyllis, foliolis ovatis cirrhiferis. *Roy. lugdb.* 365.
Vicia petiolis tetraphyllis cirrhosis. *Hort. cliff.* 360.
Vicia narbonensis. *Riv. tetr.*
Faba sylvestris, fructu rotundo atro. *Baub. pin.* 338.
Bona sylvestris. *Dod. pempt.* 516.
Habitat in Gallia, Anglia. ☉
17. VICIA caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Hort. Faba.* *cliff.* 369. *Hort. upf.* 218. *Mat. med.* 353. *Roy. lugdb.* 366. *Dalib. paris.* 220.
Faba. *Baub. pin.* 338.
Bona s. *Phaseolus.* *Dod. pempt.* 513.
 β. *Faba minor* s. *equina.* *Baub. pin.* 338.
Habitat in - - - ☉

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

> CAROLI LINNÆI

S: g̃ R: cæ M: ris Sveciæ ARculAaTRI; Mapic. & Bora,
PRorrss. UrsAr; EQUITIS DE STELLA POLARI;

SPECIES

PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,

NoMiNIBUs 'TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

Loci NaTALiBUs,

t

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

Towuusll.

Cum Privilegio S, R. Mitis Suecia. id. S. R. Mtis Polonie ac Elettoris Saxon,

T S TT TU MONT NIIS IS TUIS T DS ND ee

HOLMIZ,

'IMPENSIS LAURENTII SALVIL

17535,

[Begin Page: Page 734]

954 DIADELPHIA DECANDRIA.

Lathyrus foliis pinnatis, pedunculis multifloris. FJ. lapp. '

221 d

Lathyrus palustris; flore orobi nemorensis verni. Rapp. -

jen 2X0. f. I.

TEM lathyroides f. Lathyrus viciæformis. Pink. alim, |

387. 2. 71. f. 2

Habitat in Europa borealis pafcnis ai îs.

`beni 41, LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis dh f

phyllis, (tipulis ovatis: bafiacutis. Zierz. apj. 27... |

Habitat in Sibiria. Z

Planta sz Pifain crejcezs. Caules acute angulati: Petios |

li cirrho, [ape bexapbylli: foltolis owazo-oblongis, a

1 cutis. Stpulg foliis latiores, oUatæ, bafi acuminate

vix anzalate. Pednnenli longitudine foliorum, male

diflori. Flores violacet.

VICIA — E A

, * Peduntulis elongatis, \$T

gpifforni^ t, VICIA pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis: fo*

liolis ovatis. 3

Vicia pedunculis multitloris, petiolis polyphyllis cirrho- l

afa foliolis ovatis: infimis feifilibus. Hiort- chf. 369"

Pium, Meho porcine. Baal
 ifum. Iveltire perenne. Bax. pin.
 Pifum j Iveitre. C/nf. bifil. 2. gut
 "Habitat. 4» Paunonim [pois Z \$
 dumetorum. 2. VICIA pedunculis multifloris, foliolis Teteris ovitis :
 mucronatis, ftipulis (übdentatis. 1
 Vicia pedunculis multifloris , petiolis polyphyltis cir. |
 rhoris: foliolis alternis ovatis, ftipuiis dentatis: F^
 Juec. 604. Dalib, parif. 119. Samv. mon|p. 234.
 Vicia maxima dumetorum. a»5.. pi. 355.
 Vicia fylvatica maxima pilo fimiis. Bauh. bijt. 2. P
 f-
 Vica. fylvatica. Riv. terr. \$9.
 Habitat in Dhuringia, Galiia. Z
 dyivitia, \$ VICIA pedunculis multifloris , foliolis ovalibus , ftis
 ulis denticulatis.
 Vicia peduncuiis mulforis, ftipulis crenatis, Fl. xí
 i70. Hl. Juec: 603. Riy. lugdb. 365. Sav. |
 4.
 Vids multidora maxima. perennis , tétro odore, m ;

[Begin Page: Page 735]

DÍADELPHIA DECANDRIA. 73j
 | ^" bus dlbentibus: lineis ceruleis notatis. P/æk, alm.
 E. 3955.2. 71-1. 1. : Wen L4 D
 "Habitat in Sueciz, Germanie, Gallie fylvir, Z `'
 :4. VICIA pedunculis fubfexfloris, foliolis denis. ovatis caf»biós;
 P ^o acutis, ftipulis integris. ; NEVER
 Vicia pedunculis multifloris , caule fruticofo. Hort. cliff.
 E . 369. Roy. lugdb. 364. — T Al
 |^ Vicia multiflora caflubica frutefcens; filiqua lentis.
 E Plak, aba. 387.2. 72. f- 35 — |
 | Habitat ia Germania. : ,
 - f. VICIA pedunculis inultifloris, floribus imbricatis, fo- Craeca.
 .liolis lanceolatis pubefcentibus, ftipulis integris. .
 |. Vicia pedunculis mültifloris, ftipulis utrinque acutis in-
 : tegris. Horz. "lif. 368. Fl. fuec. 6og. Roy. ingdb.
 < 364. Dálilb. parif. 220. Sauv. monfp. 2.34.
 Vicia fylveftris fpicata. Bauh. pin. 345.
 . Vicia mültfora. Bax. pis. 343.
 | Cracca. Riv. terr. 49. ;
 - Habitat in Enropæ pratis, agris. Y j
 F6 VICIA pedunculis multiftóris, forbit diftantibus, fo-eniackat-
 - . liolis linearibus; ftipulis inferne denticulatis. des,
 |. Vicia pedunculis multifloris, ftipulis crenatis, foliolis
 : (.inéaribus. Sa. mou|p. 2 jf | :
 | Vicia onobrychidis flore. Bauh. pis. 34\$. prodr. 149.
 | dHabizar in Gallia. D. Savage. |
 | Statura ie Cracce. Folia pinnata, cirrbo[a: foliolis
 p Sapias 14, linearibus , anguflifimis : oppofittomibus di-
 [[— Jiantibus. Pedunculi axillares, foliis triplo longiores,
 - Miriati.- Floribus to. f. 12, fubfeffilibns , remotifimis,
 racce értplo majoribus, purpureis.
 1 VICIA pedunculis multifloris, foliolis oblongis, ftipu- wifolians.

A lis integris, leguminibus villosis ovato-oblongis. :
icia leguminibus feffilibus binis ternisve fubovatis nu-
tantibus, ftipulis nullis. Roy. lugdb. 14? eng
icia orientalis, flore fuave rubente, filiquis brevitfimis.
Ber. lugdb. 2. p. 44? - i
abitat in Oriente. RRT
ndis fulearus, Cirrhi foliolis 6 paribus, oblongis, vix
retujis, actonine terminatis, fubvillosis. Stipule lanceo-
ate angufiifimæ, Pedunculi floribus \$. f. 6, mini-
M» atropurpuréis. Legumina sntasiia, compre[Ja ,
| VUatectblongo, villofa, penzáferma.
3j
Mee
8. VI-

[Begin Page: Page 736]

73\$ X DIADELPHIA DECANDRIA.

Mem, \$8. VICIA pedunculis multifloris, petiolis fulcatis fubdo- :
decaphyllis: foliolis lanceolatis glabris.

Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis: foliolis 1
lanceolatis glabris. Hort. wpf. 219. *

Habitat. in Sibiria. d:

bengbalenfs. 9, VICIA pedunculis fubquinqueflóris, foliolis integerr- -
- mis, flipulis integris, leguminibus ere&iufculis.

Vicia pedunculis fubquinquefloris longitudine foliorum. |

Hort. cff. 368. Hort. upf. 319. Roy. lugdb. 365.

Vicia put is hifuta & incana, filiquis pili. Herm. |
lugdb. 623 t. 62g.

Habt in Benghala. o

* Floribus axillaribus, fabfe fúbus.

pive, i10. VICIA leguminibus feffilibus fubbinatis ere&is, foliis - |
- retufis, ftipulis notatis.

Vicia leguminibus ete&is, petiolis polyphyllis: foliolis 2-3
cumine emarginatis " ulis denticulatis. 'Horz. cliff.

68. Hort. wpf. 218. Fl. fuec. Gox. Roy. lugdb. 36\$.
alib. parif. 218.

Vicia fativa vulgaris, femine wid Banh. qua. 3.

Vicia fativa alba. Bauh. pin.

Habitat inter Europæ fegetes eiie: QO.

- Stipule fubtus macula quafi inufa notate..

Latbyreides. 11, VICIA leguminibus feffilibus folitariis ere&is glabris, - |
foliolis fenis: inferioribus obcordatis,

Vicia lathyroides, purpuro-czruleis floribus. Herm. par. |
242. f..242.

Vicia montana minima, flofculo purpureo. Amon. acad. 1
l. p. 167.

Habitat in Scotia, Lufatia. ©

lutes 12. VICIA leguminibus feffilibus reflexis pilofis s folita- | |
riis pentafermis, corolle vexillis glabris.

Vicia foliis fúbfeffii

tis, leguminibus folitariis villosis. Dali^ parif. 219-
y icla iuris folitariis deorfum flexis hifutis. Saso —

on[p. 135.

Vicia ayi Iveítris lutea, filiqua hifuta. Bazh. E MP

Vicia bet luteo pallido, filiquis hirsutis caulis brevibus propendentibus. AMor;]. etas 2. p. 62. f. 2.. t. 21. f. \$. I Habitat in Gallia.

Variat foliis lanceolatis & rebah is, Leguminibus A tis Cy fubglabris. Stipula alternatim integerrime tridentate.

15. VE

libus obverfe ovatis apice emargipa- - 1

X

[Begin Page: Page 737]

DIADELPHIA DECANDRIA. 737

- 15. VICIA leguminibus feffilibus reflexis pilofis penta- bybrida.

1 fpermis, corolle vexillis villofis. — ^.

Habitat Monfpetii; Maffilie. © - PESES oí

Affinis V. lute. Foliola obver[fe ováta, retu[a, para, pilis adijperfa. Stipulg non ad caulem fufce.fed tote virides, Flores favi, fupra fubgrijes y pslofi. Cezera j V. lautee. MIUULUON ITA ER

: 34. VICIA leguminibus fubfeffilibus pendulis glabris te- peregrina.

: taípermis , foliolis linearibus emarginatis. :

icia peregrinà anguftiflimis foliis, filiqua láta glabra. n4

Pluk. alm. 386. 2.333. f. 6. — :

Lc Viciaanguftifolia psrpurco-violacea;diliqua lata glabra.

|. Mags. moz[p. 2376. or

| Habitat in Galia. D. Senvages. @

15. VICIA leguminibus pedicellatis fubquaternis ete&is , epum.

| foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decreícenti-

bus. ` C. 3 |owpst iiti

Vicia leguminibus: adfcendentibus, petiolis polyphyllis,

foliolis ovatis! acútis integerrimis. : Hors. ehf. 563.

£l. fuec. 603. Roy: Ingdó. 365. Dalit.: parij. 219.

San. mroxfp. A354. cultu e Tuan e

icia rei folla rotundiore acuto. Bauh. pis. 545.

icia fepium. Aio zer. \$6; 50093 s

Habitat in Europ fepibus. X : i PUR

| 16. VICIA leguminibus fubfeffülibus folitariis erectis, fo- neizenenijr.

|. ^ liolis fenis fubovatis, ftipulis denticulatis. Hort. af.

Eo DIE arp. imonfp. 354: 52, voTLV v

© Vii petiolis inferioribus tetraphyllis: fuperioribus po-

T Apiyis foliolis ovatis cirrhiteris. Roys /ugd5. 365.

Vicia petiolis tetraphyllis cirrhofis. ZZorz. chiis 360.

icid, narbonenfis. Kzv. tetr. Y.

Faba fylvettris, fructu rotundo atro. Baz. pin. 338.

Bona iylveitris. Dod. pexopr. \$16. ;

„Habitat in Gallia, Anglia. O” siot

37. VICIA caule :eré&o, petiolis absque - cirrhis. Hort. Faba,

eif. 19: Hort. «pf. 238. Mat. ined..353. Roy dngas.

1 396. Dalib. parif. sash ne es

| Fsba. Bauh. pin, 1329s... (Tg

| Bang f. Phaitolu Dod. pempi. \$313... —

B. Fata minor f. equina. Baub. pin. 338.

E Habitatig. = uo. o E

be o CICER

