



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Handbuch zur Erkennung der nutzbarsten und am
häufigsten vorkommenden Gewächse**

Berlin, Spenerschen Buchhandlung, 1829-1833

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/129754>

v.1: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/224929>

Page(s): Page [iii], Page 632

Holding Institution: Harvard University Botany Libraries

Sponsored by: BHL-SIL-FEDLINK

Generated 23 April 2024 10:24 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1694005i00224929.pdf>

This page intentionally left blank.

Handbuch

zur

Erkennung

der

nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden

Gewächse.

Von

D. H. F. Link,

Geheimen Medizinal-Rathe, ordentlichem Professor der Arzneikunde,
und Director des botanischen Gartens, Mitgliede der Academie der
Wissenschaften zu Berlin etc., Ritter des rothen Adler-Ordens
u. s. w.

Erster Theil.

Berlin, 1829.

In der Haude und Spenerschen Buchhandlung.

(S. J. Josephy.)

longe petiolata. Ped. axillares subtriflori. — Stamm aufsteigend, wenig ästig. Blätter herzförmig, tief gesägt; die untern lang gestielt. Blattstiele in d. Blattwinkeln fast dreiblütig. Auf Alpen im südl. Europa. P. *Campanula Elatines* Linn.

3. *W. hederacea*. Epheublättrige W. Caulis procumbens ramosus tener. Folia petiolata cordata quinqueangularia. Ped. terminales elongati. — Stamm niederliegend, ästig, zart. Blätter gestielt, herzförmig, fünfeckig. Blütenstiele am Ende, verlängert. Im südl. Europa. P. Blaue Blumen.

4. *W. lobelioides* Schrad. Lobelien W. Caulis ramosus virgatus. Folia lanceolata denticulata glabra. Ped. filiformes elongati. Cor. sub 3—4flori. Caps. 2-ocularis. — Stamm ästig, ruthenförmig. Blätter lanzettförmig, gezähnt, glatt. Blütenstiele fadenförmig, lang. Blume fast 3—4theilig. Kapsel zweifächerig. Auf Madeira, den Canarischen Inseln. J. Röthliche Blumen.

5. *Chrysantha*. Goldklocke. Cal. 5partitus persistens coloratus. Cor. subrotata. Stam. basi dilatata. Stylus 5partitus. Caps. 5ocularis; sporophora 5 duplicata. Pentandr. Monogyn. — Kelch fünftheilig, dauernd, gefärbt. Blume fast radförmig. Staubfäden an der Basis ausgebreitet. Griffel fünftheilig. Kapsel fünffächerig; 5 gedoppelte Samenträger.

1. *C. aurea*. Madeira G. Caulis fruticosus. Folia oblonga et lanceolata inaequaliter crenulata carnosula glabra. — Stamm strauchartig. Blätter länglich und lanzettförmig, ungleich fein gekerbt, fleischig, glatt. Auf Madeira. Gelbe Blüten. *Campanula aurea* Linn.

6. *Canarina*. Canarine. Cal. 6partitus. Cor. campanulata 6fida. Stam. 6 basi dilatata. Stylus 6partitus. Caps. 6ocularis. Hexandria Monogynia. — Kelch sechstheilig. Blume klockenförmig, sechsspaltig. Staubf. 6 an der Basis ausgedehnt. Griffel sechstheilig. Kapsel sechsfächerig.

1. *C. Campanula* Linn. Klockenförmige C. Folia opposita ex ovato et hastato oblonga et lanceo-

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page [iii]]

Handbuch
zur
Erkennung
der
nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden
Gewächse.
Von
D. H. F. Lin k.
Geheimen Medizi iial-Rathe, ordentlichem Professor der Arzneikunde,
and Director des botanischen Gartens, Mitglieder der Acadeinie der
Wissenschaften zu Berlin etc., Ritter des rothen Adler- Ordens
u, s. w.
Erster Theil.
Berlin, 1829.
In der Haude und Spenerschen Buchhandlung.
(S, J, Joseephy,)

[Begin Page: Page 632]

632
CL II. Exogeneae.
longe petiolata, Ped. axillares subtriflori. — Stamm
aufsteiaend, wenig- ästig. Blätter herzförmig, tief ge-
sägt; die xinteru lang gestielt. Blattstiele tn d. Blatt-
winkeln fast dreibliitig. Auf Alpen iin siidl. Europa.
F. Campaniila Elatines Linn.
3. Jf\ hedevacea, Ep heu blättrige AV. Caulis
procumbens ramosus teuer. Folia petiolata cord ata
quinqueangularia. Ped. terininales elongati. — Stamm
iiederliegend, ästig, zart. Blätter gestielt, herzför-
mig, fünfeckig-. Blütenstiele am Ende, verlängert. Im
südl, Europa. P. Blaue Blumen.
4, W", lohelioides Schrad. Lobelien W. Caulis
ramosus virgatus. Folia lanceolata deiiticulata glabra.
Ped. filiformes elongati. Cor. sub 3— 4flori. Caps. 2-
lpcularis. — Stamm ästig-, ruthenförmig. Blätter lan-
zettförmig, gezähzelt, glatt. Blütenstiele fadenförmig,
lang. Blume fast 4theilig. Kapsel zweifächerig.
Aut Madeira, den Cauarischen Inseln. J. Röthliche
Blumen.
5. Clirysangia. Goldklock e. Cal. Spartitus
persistens coloratus. Cor, subrotata. Stam. basi dila-
tata. Stylus Spartitiis, Caps. Slocidaris; sporophora
5 duplicata, Pentandr. Monogyn. — Kelch fünfthei-
Hg, dauernd, gefärbt. Blume fast radfÖrmigc Staubfä«
dgn an der Basis ausgebreitet. Griffel fünftheilig.
Kajisel fünfiächeiig; 5 gedoppelte Samenträger.
1, C. aurea, Madeira G. Caulis fruticosus. Fo-?
lia oblonga et lanceolata inaeqiialiter crenulata carno-

sa glalira. — Stamm strauchartig. Blätter länglich und lanzettförmig, ungleich fein gekerbt, fleischig, glatt. Auf Madeira. GeUie Blüten. Campaniila aurea Linn,

6. Canarina, Canarine. Cal. 6partitus. Cor, campanulata 6fida, Stam. 6 basi dilatata. Stylus 6partitus. Caps, ölocularis. Hexandria Monogynia. — Kelch sechstheilig. Blume klockenförmig, sechsspaltig. Staubf. 6 an der Basis ausgedehnt, Griffel sechstheilig. Kapsel sechsfächerig.

1. C, Cairvpanula Linn. Klo cken form ige C.

Folia opposita ex ovato et hastato oblonga et lanceo-